

флори та фауни. Національні парки, заповідники та природні заказники відіграють важливу роль у збереженні цінних екосистем, рідкісних видів тварин та рослин, а також в управлінні та охороні природних ресурсів для майбутніх поколінь. Одеська область зобов'язана продовжувати свою роботу у напрямку екологічного збереження та створення стійких умов для розвитку природи та людського суспільства.

Список використаних джерел

1. Природно-заповідний фонд України. Одеська область. URL: <https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-15.html> (дата звернення: 03.03.2024).
2. Атаки РФ на Одещину спричинили шкоди довікллю на понад 11 мільярдів гривень. URL: <https://suspilne.media/472852-ataki-rf-na-odesinu-spricinili-skodi-dovkillu-na-ponad-11-milardiv-griven/> (дата звернення: 03.03.2024).

Чередніченко С.Ю.

Здобувачка 20 групи ФМЕ

Михайлюк О.Л.

кандидат економічних наук, доцент

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ВІД ШУМОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОДЕСИ

Шумове забруднення – це невід'ємна частина сучасного світу, ймовірно, найдражливіший аспект екологічних проблем. На тлі забруднення повітря, ґрунту та води людство стикається з викликом боротьби з надмірним шумом.

Одеса, одне з найбільших міст України, стикається з серйозною проблемою шумового забруднення. Шум від транспорту, промислових підприємств, будівельних майданчиків та інших джерел негативно впливає на здоров'я та якість життя людей.

Основними джерелами шуму в Одесі є:

- 1) транспорт: автомобільний транспорт, трамваї, тролейбуси, автобуси, мотоцикли, мопеди, а також авіаційний шум від літаків;
- 2) будівельні роботи: шум від будівництва, ремонту та реконструкції доріг, будинків та інших об'єктів;
- 3) промислові підприємства: шум від роботи заводів, фабрик та інших промислових об'єктів;
- 4) розваги: шум від барів, ресторанів, нічних клубів та інших розважальних закладів.

Надлишковий шум може мати ряд негативних наслідків для здоров'я людей, таких як:

- погіршення слуху: тривалий вплив шуму може призвести до погіршення слуху, а в деяких випадках навіть до глухоти;
- хвороби серця: шум може підвищувати артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень та ризик розвитку серцево-судинних захворювань;